

## Keuhkoverenkierron oikovirtauksen gammakuvaus

Tutkimuksessa selvitetään keuhkoverenkierron oikovirtausta.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 30 minuuttia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

### Tutkimukseen valmistautuminen

Syö ja juo sekä ota lääkkeesi normaalisti tutkimuspäivänä. Ota mukaan tiedot käyttämästäsi lääkkeitä ja niiden annostuksesta.

### Tutkimus

Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli, josta ruiskutetaan pieni määrä radioaktiivista tutkimusainetta verenkiertoon. Kuvaus tehdään heti sen jälkeen ja se kestää noin 10 minuuttia.

Kuvauksen ajan olet makuulla ja sinun pitää olla liikkumatta. Kuvaus on kivuton.

### Tutkimuksen jälkeen

Juo runsaasti nestettä ja virtsaa virtsarakko tyhjäksi tavallista useammin tutkimuksen jälkeen, jotta radioaktiivinen tutkimusaine poistuisi elimistöstä.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Jos imetät, pidä 12 tunnin imetystauko tutkimusaineen antamisen jälkeen. Lypsy maito tauon loppupuolella ja kaada maito viemäriin.

### Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.



**Potilasohje**  
Diagnostiikkakeskus  
Isotooppilääketiede

[www.tutkimukseen.fi](http://www.tutkimukseen.fi)

Voimaantulopäivä: 12.6.2023

Kieliversiot: suomi, svenska, English

Tutkimus: 22084 Pt-HepPulG Keuhkoverenkierron oikovirtauksen gammakuvaus, hepatopulmonaalinen oireyhtymä (GD3PN)

Tunniste: 3339