

Munuaisparenkyymin gammakuvaus

Tutkimuksessa selvitetään munuaisten kokoa, rakennetta, sijaintia ja toimintaa.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 3,5 tuntia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Alle 7-vuotiaille lapsille asetetaan kanyyli valmiiksi laskimoon lähettävässä yksikössä. Jos tarvitaan rauhoittavaa lääkettä, se annetaan lähettävässä yksikössä.

Aikuisilta tutkimus ei edellytä valmistautumista.

Tutkimus

Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli, josta lääkäri ruiskuttaa pienen määrän radioaktiivista ainetta verenkiertoon.

Merkkiaine kertyy munuaiseen noin kolmen tunnin ajan, jonka jälkeen aloitetaan kuvaus gammakameralla. Väliaikana voit poistua sairaalasta, jos haluat.

Kuvaus tapahtuu makuuasennossa ja se kestää noin 15 minuuttia. Kuvaus on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuksen jälkeen. Säteilevä merkkiaine poistuu virtsan mukana.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Jos imetät, pidä 4 tunnin imetystauko tutkimusaineen antamisen jälkeen. Lypsä maito tauon loppupuolella ja kaada maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.



Potilasohje
Diagnostiikkakeskus
Isotooppilääketiede

www.tutkimukseen.fi