

Pernan ja lisäpernan gammakuvaus

Tutkimuksessa selvitetään pernan kokoa, muotoa, sijaintia ja lisäpernojen lukumäärää.

Tutkimus kestää yleensä noin 1 – 1,5 tuntia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohejeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda sekä ottaa lääkkeesi normaalisti.

Tutkimus

Sinulle laitetaan laskimokanyyli käsivarteen, sitä kautta saat pienen määrän radioaktiivista merkkiainetta. Kuvaus aloitetaan noin 20 minuutin kuluttua merkkiaineen annosta ja kestää 30 – 60 minuuttia.

Kuvaus tapahtuu makuuasennossa ja on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuksen jälkeen. Säteilevä merkkiaine poistuu virtsan mukana.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Älä imetä 1 vuorokauden ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

