

## Suolistoverenvuodon gammakuvaus

Tutkimuksessa paikannetaan suolistoverenvuotoa.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 1 – 6 tuntia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

### Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda sekä ottaa lääkkeesi normaalisti.

### Tutkimus

Sinulle laitetaan kanyyli käsivarren laskimoon. Sitä kautta saat pienen määrän radioaktiivista tinayhdistettä. Tinayhdiste kiinnittyy punasoluihin.

Noin 20 minuutin kuluttua sinulle annetaan verenkiertoon toinen radioaktiivinen tutkimusaine. Tämä tutkimusaine hakeutuu punasoluihin kiinnittyneeseen tinayhdisteeseen. Vatsanseudun kuvaus gammakameralla aloitetaan välittömästi tutkimusaineen antamisen jälkeen ja kestää noin tunnin.

Uusia kuvia saatetaan ottaa noin tunnin välein. Viimeinen kuvaus voidaan tehdä vielä tutkimuspäivää seuraavana aamuna.

Kuvausten ajan olet makuuasennossa. Kuvaukset ovat kivuttomia.

### Tutkimuksen jälkeen

Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuksen jälkeen. Säteilevä merkkiaine poistuu virtsan mukana.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Jos imetät, pidä 12 tunnin imetystauko tutkimusaineen antamisen jälkeen. Lypsä maito tauon loppupuolella ja kaada maito viemäriin.

### Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.



**Potilasohje**  
Diagnostiikkakeskus  
Isotooppilääketiede

[tutkimukseen.fi](https://www.tutkimukseen.fi)