

Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos TT levossa (PET-TT-tutkimukseen liittyen)

Tutkimuksessa selvitetään sydänlihaksen verenkiertoa.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 3 tuntia.

Tutkimusta ei tehdä raskaana oleville.
Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon.

Ennen tutkimusta

Ota lääkkeet normaalisti.

Älä käytä alkoholia 1,5 vuorokautteen ennen tutkimusta.

Älä tupakoi 4 tuntiin ennen tutkimusta.

Syö tutkimuspäivänä normaali aamupala tai kevyt lounas, esimerkiksi keitto tai salaatti.

Tutkimus

Tutkimus alkaa noin 30 minuutin levolla osaston tiloissa. Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli (ohut putki verisuoneen). Sitä kautta saat pienen määrän radioaktiivista tutkimusainetta.

Kuvaus kestää noin 30 minuuttia.

Kuvauksessa olet selinmakuulla kädet ojennettuina pään yläpuolelle.

Tutkimuksen jälkeen

Säteilevä tutkimusaine poistuu virtsan mukana. Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuksen jälkeen.

Jos imetät, pidä 4 tunnin imetystauko tutkimusaineen antamisen jälkeen. Lypsä maito tauon loppupuolella ja kaada maito viemäriin.

Kun olet saanut radioaktiivista tutkimusainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastauksen lähettävästä yksiköstä lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.



Potilasohje
HUS Diagnostiikkakeskus
Isotooppilääketiede

www.tutkimukseen.fi