

## Radiofosforihoito

Radiofosforia käytetään hoidettaessa verisairauksia, joissa veren solumäärät ovat kasvaneet poikkeavan korkeiksi.

Varaa käyntiin aikaa noin 15 minuuttia.

### **Hoitoon valmistautuminen**

Saat syödä ja juoda sekä ottaa lääkkeesi normaalisti.

Juo nesteitä (esim. vettä tai mehua) vähintään 2 litraa päivässä 2 päivän ajan ennen hoitoa. Hoito rasittaa munuaisia ja saattaa aiheuttaa kihtiä, jos sinulla on kihtiin taipumusta. Juomalla riittävästi haittavaikutukset vähenevät.

Jos sinulla on munuaissairauksia, keskustele hoitavan lääkärin kanssa, onko tarpeen aloittaa hoidon yhteydessä Apurin® -lääkitys munuaisten suojaamiseksi.

### **Hoito**

Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli, josta lääkäri ruiskuttaa radioaktiivista radiofosforia verenkiertoon.

Radiofosfori kertyy luuytimeen, jossa se vähentää punasolujen ja verihytaleiden tuotantoa. Hoidon vaikutus on arvioitavissa usein vasta 2 – 3 kuukauden kuluttua.

### **Hoidon jälkeen**

Radiofosfori ei säteile ympäristöön, joten hoidosta ei koidu vaaraa muille ihmisille.

Hoidon jälkeisinä päivinä on tärkeää nauttia nesteitä (esim. vettä tai mehua) vähintään 2 litraa päivässä.

### **Ota huomioon**

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Hoidosta ei tule erillistä maksua.  
Peru aika, jos et pääse tulemaan.  
Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

