

## Isotopundersökning av blodcirkulationens förbiledning i lungorna

I undersökningen utreds förbiledning av blodcirkulationen i lungorna.

Reservera cirka 30 minuter för undersökningen.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs i regel inte till kvinnor som är gravida.

### Förberedelse för undersökningen

Du får äta och dricka normalt samt ta dina läkemedel som vanligt. Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

### Undersökning

Du får en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen. Undersökningen genomförs direkt efter det och den tar cirka 10 minuter.

Under undersökningen ligger du på rygg och du måste vara orörlig. Undersökningen är smärtfri.

### Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan oftare än normalt efter undersökningen så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

Amma inte på 12 timmar efter att du fått undersökningsämnet. Pumpa ut mjölken i slutet av avbrottet, och håll bort den.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.



**Patientanvisning**  
Diagnostikcentrum  
Nukleärmedicin

[www.undersökningshuset.fi](http://www.undersökningshuset.fi)

Träder i kraft: 12.6.2023

Språkversionerna: suomi, svenska, English

Undersökning: 22084 Pt-HepPulG Keuhkoverenkierron oikovirtauksen gammakuvus, hepatopulmonaalinen oireyhtymä (GD3PN)

Tunniste: 3347