

Isotopundersökning av lymfkärnen

Undersökningen utreder sjukdomar i lymfsystemet och det fria flödet av lymfvätska.

Reservera cirka 1 – 6 timmar för besöket.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs i regel inte vid graviditet.

Förberedelse för undersökningen

På undersökningsmorgonen kan du äta och dricka normalt samt ta dina läkemedel som vanligt.

Undersökning

Under huden injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne mellan stortån och tån intill och/eller mellan tummen och pekfingeret. Undersökningsämnet transporteras till lymfkörtlarna via lymfkärnen.

Den första bildtagningen genomförs direkt efter injiceringen. Bildtagningen pågår i en timme eller tills lymfkörtlarna avbildas.

Nya bilder kan tas 2, 4 och 6 timmar efter att du fått spårämnet. Du måste upp och gå mellan bildtagningarna.

Under bildtagningar skall du ligga på rygg på undersökningsbordet. Bildtagningarna är smärtfria.

Efter undersökningen

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

Amma inte på 4 timmar efter att du fått undersökningsämnet. Pumpa ut mjölken i slutet av avbrottet, och håll bort den.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

