

## Isotopundersökning av magsäckens funktion

Syftet med undersökningen är att utreda störningar i tömningen av magsäcken.

Reservera cirka 4,5 timmar för undersökningen.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs i regel inte vid graviditet.

### Förberedelse för undersökningen

Ät eller drick inget på 6 timmar före undersökningen.

Rök inte på undersökningsmorgonen.

Ta inte följande läkemedel 2 dagar före undersökningen:

- metoklopramid (Primperan)
- erytromycin
- domperidon (Motilium)
- opioider (Oxycontin, kodein)
- antikolinergika (Robinul).

Ta övriga läkemedel som vanligt.

### Undersökning

På undersökningsstället får du äta rostat bröd med omelett. Den innehåller en liten mängd radioaktivt undersökningsämne. Om du har specialkost ska du så snart som möjligt informera ditt undersökningsställe om detta.

Bildtagningen med gammakamera inleds direkt när du har ätit upp och den tar ungefär

en minut. Ytterligare bilder på dig tas efter 1, 2 och 4 timmar.

Bildtagningen görs stående eller sittande och är smärtfri.

Under undersökningen får du inte äta, dricka eller röka.

### Efter undersökningen

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningsdagen.

Amma inte på 12 timmar efter att undersökningsmedlet har tilldelats. Om du har mjölkat under pausen, håll mjölken i avloppet.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

