

## Isotopundersökning av mjälte och accessorisk mjälte

Undersökningen utreder mjältens storlek, form, läge och antalet accessoriska mjältar (bimjältar).

Reservera cirka 1 – 1,5 timmar för undersökningen.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs inte vid graviditet.

### Förberedelse för undersökningen

På undersökningdagen får du äta och dricka samt ta dina läkemedel som vanligt.

### Undersökning

Du får en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen. Bildtagningen genomförs cirka 20 minuter efter det och den tar cirka 30 – 60 minuter.

Under bildtagningen skall du ligga på rygg på undersökningsbordet. Bildtagningen är smärtfri.

### Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan oftare än normalt så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

Amma inte på ett dygn efter att undersökningsmedlet har tilldelats. Om du har mjölkat under pausen, håll mjölken i avloppet.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

