

## Isotopundersökning av njurparenkym

I undersökningen utreds njurarnas storlek, struktur, placering och funktion.

Reservera cirka 3,5 timmar för undersökningen.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs i regel inte till kvinnor som är gravida.

### Före undersökningen

Barn under 7 år får venkanylen insatt redan på den remitterande enheten. Om barnet behöver lugnande läkemedel ges det på den remitterande enheten.

För vuxna förutsätter undersökningen ingen förberedelse.

### Under undersökningen

Du får en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen.

Spårsubstansen ansamlas i njuren under cirka tre timmar efter vilket undersökningen med gammakamera inleds. Under tiden däremellan kan du lämna sjukhuset, om du vill.

Undersökningen genomförs i liggande ställning och den tar cirka 15 minuter. Undersökningen är smärtfri.

### Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan oftare än normalt efter undersökningen så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

Amma inte på 4 timmar efter att du fått undersökningsämnet. Pumpa ut mjölken i slutet av avbrottet, och håll bort den.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.