

Sköldkörtelns isotopundersökning

Med hjälp av undersökningen utreds sköldkörtelns storlek, form, struktur och aktivitet.

Undersökningen tar cirka 3 – 4 timmar.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i slutet av denna anvisning. Undersökningen utförs i regel inte vid graviditet.

Före undersökningen

På undersökningdagen kan du äta och dricka normalt.

Din behandlande läkare ger anvisningar om ett eventuellt uppehåll med läkemedel!

Vanligtvis måste man uppehålla tyrostatbehandlingen som minskar sköldkörtelfunktionen under 2 dygn och med tyroxin 4 veckor innan undersökningen.

Läkemedlet amiodaron mot arytmia måste pausas under 2 veckor innan undersökningen om det bara är möjligt.

Preparat som innehåller en stor mängd jod ska pausas 2 veckor innan undersökningen om det är möjligt. Dessa är:

- naturpreparat som innehåller alger
- hostmediciner, vitaminpreparat, hudkrämer, ögondroppar, tarmantiseptiska medel, suppositorier och vagitorier som innehåller jod.

Röntgenundersökningar som görs med jodhaltiga kontrastmedel får inte göras 2 veckor innan undersökningen.

Undersökningen

Du får en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne. Undersökningsämnet samlas i sköldkörteln under 3 timmar och efter det genomförs undersökningen med gammakamera. Undersökningen tar cirka 20 minuter. Under tiden däremellan kan du avlägsna dig från sjukhuset om du vill.

Under bildtagningen ska du ligga på rygg på undersökningsbordet. Bildtagningen är smärtfri.

Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt töm urinblåsan oftare än normalt så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

Amma inte på 12 timmar efter att undersökningsmedlet har tilldelats. Om du har mjölkat under pausen, håll mjölken i avloppet.

Annat att beakta

Mer information om läkemedlen som nämns i denna anvisning hittar du på adressen www.laakeinfo.fi. Du kan även fråga den behandlande läkaren.

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.