

PET-magnetundersökning av ämnesomsättningen i nedre delen av buken (prostata)

Med hjälp av undersökningen kan undersökas om det i prostatan eller någon annanstans i kroppen finns något som tyder på elakartat.

Undersökningen tar cirka 4 timmar.

Bekanta dig i förväg med blanketten för förhandsinformation. Ta med dig den ifyllda blanketten med förhandsinformation.

Före undersökningen

Köp en Toilax-förpackning som innehåller fyra tabletter och ett lavemang på apoteket för att tömma tarmen. De är receptfria. Det är viktigt att du tömmer tarmen enligt anvisning.

Dagen före undersökningen:

- Ät och drick normalt.
- Ta de läkemedel som läkaren ordinerat på normalt sätt.
- Ta två Toilax-tabletter på morgonen. Se anvisningen på förpackningen.
- Ta två Toilax-tabletter på kvällen.

På undersökningdagen:

- Ta bort smycken och lämna dem hemma.
- Ta lavemanget 3–4 timmar före undersökningen. Se anvisningen på förpackningen. Lavemanget tömmer ändtarmen.
- Fyra timmar före undersökningen ska du vara utan att äta och dricka.

Ta de läkemedel du använder regelbundet med en liten mängd vatten.

Om du har ett läkemedelsplåster ska du förlägga bytet till undersökningdagen. Ta bort det gamla plåstret under tiden undersökningen genomförs. Lägg på ett nytt plåster efter undersökningen.

Om du har en glukossensor som mäter sockerhalten i vävnadsvätskan, måste den avlägsnas innan undersökningen. Ta med dig en ny sensor.

Under undersökningen

Du får en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen.

Bildtagningen börjar ungefär en timme efter att du har fått undersökningsämnet. Röntgenskötaren hjälper dig att få en bekväm liggposition på röntgenapparatens bord.

För att undersökningen ska lyckas måste du vara orörlig.

Du får läkemedel via venkanylen som gör tarmen avslappnad. På så sätt blir bilderna bättre.

Du får öronproppar och hörselskydd eftersom undersökningsapparaten har hög ljudnivå. Du kan lyssna på radio om du vill.

Röntgenskötaren är i ett angränsande rum under undersökningen. Skötaren ser och hör dig under undersökningen.

Röntgenläkaren beslutar om du behöver få magnetkontrastmedel injicerat i blodomloppet. Kontrastmedlet bidrar till att man bättre kan urskilja vävnaderna på bilderna.

Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan oftare än normalt efter undersökningen så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningsdagen.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Annat att beakta

Om du har cellskräck, det vill säga klaustrofobi, berätta det för röntgenskötaren som tar emot dig.

Om du vet att du behöver ett lugnande medel, kom till enheten 30 minuter före undersökningstiden. Berätta det då du anmäler dig och att du behöver ett lugnande medel.

I ankomstansvisningen eller i kallelsebrevet finns kontaktuppgifter, ifall du har frågor om undersökningen.

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.

PET-magnetundersökning av ämnesomsättningen i nedre delen av buken (prostata)

Fyll noggrant i blanketten för förhandsinformation och ta den med dig till undersökningen.

Namn _____

Personbeteckning _____

Längd _____ cm Vikt _____ kg

Har du främmande föremål i din kropp? _____

Vilka: _____

Var: _____

Har du på dig:

Ja Nej

Läkemedelsplåster (ta bort det)		
Glukossensor (ta bort den)		
Hörapparat (ta bort den)		
Ifall du svarar ”JA” på någon av de nedan nämnda frågorna, ring Mejlans isotopenhet 040-632 5991.		
Pacemaker eller pacemakerkablar		
Nervstimulator eller stimulatorkablar		
Artärbräck(aneurysm)- eller operationsclips eller coils		
Implantat i inner- eller mellanörat		
Läkemedelspump		
Metallsplitter, kulor eller hagel i kroppen		
Shunt i huvudet		
Bröstexpanderprotes		
Medicinskt implantat som satts in utomlands		

Observera följande!

- Glukossensorn, läkemedelsplåstret och/eller hörapparaten måste tas bort före bildtagningen.
- Konstgjorda leder, hjärtklaffprotes, skruvar och plattor i ben, steriliseringsclips, tandproteser eller -ställningar hindrar normalt inte en bilddiagnostisk undersökning, men berätta om dem för personalen på magnetenheten.
- Tekniska sportkläder och medicinska kompressionskläder kan innehålla silver och bör därför bytas ut mot sjukhuskläder.
- Vid undersökningar som gäller ögonområdet får man inte ha ögonmakeup.
- Om du har ett implantatkort, ta det med dig.

Har du genomgått en operation/endoskopi/biopsi (provbit) under det senaste halvåret?

ja nej

Vilken, när? _____

Lider du av eller har du lidit av (kryss i rutan):

- sockersjuka (diabetes) tuberkulos
 hjärtinfarkt inflammation i tarmsystemet
 njursjukdom
 annan inflammationssjukdom, vilken? _____
 annan långvarig sjukdom, vilken? _____
 trauman (frakturer, skador), vilka? _____

Har du under de senaste 2 veckorna fått följande medicinering?

Kortison ja nej
Tillväxtfaktor för blodceller ja nej
Cytostatika ja nej

Om du genomgått cytostatikabehandling eller fått tillväxtfaktorer för blodkroppar inom två veckor före undersökningdagen, ta kontakt med Mejlans isotopenhet 040-632 5991.

Har du fått strålbehandling under de tre senaste månaderna?

ja nej

När? _____ På vilket område? _____

Om du genomgått strålbehandling inom tre månader före undersökningdagen, ta kontakt med Mejlans isotopenhet 040-632 5991.

Är det möjligt att du är gravid?

ja nej

Ifall du misstänker att du är gravid, ta kontakt med din enhet före undersökningen.

Har en läkarmottagningstid/telefonid bokats för dig?

ja nej

När? _____