

## Radiofarmaceutisk läkemedelsbehandling, Radium-223

Radium-<sup>223</sup> används för behandling av prostatacancer hos vuxna när behandling som minskar manliga könshormoner inte har effekt på tumören.

Reservera cirka 30 minuter för besöket.

### Före behandlingen

På behandlingsmorgonen kan du äta och dricka normalt samt ta dina läkemedel som vanligt.

Du måste lämna ett blodprov innan du får radiofarmaceutisk läkemedelsbehandling. Avdelningen/polikliniken som behandlar dig ger närmare anvisningar.

### Under behandlingen

Du får en venkanyl i armen och genom den injicerar läkaren en liten mängd radioaktivt ämne i blodet.

Du får en spruta med radium-223-diklorid med fyra veckors intervall i sex månader.

### Efter behandlingen

Drick rikligt med vätska och töm urinblåsan oftare än vanligt efter behandling för att minska strålningsbelastningen.

Iakta särskild försiktighet vid toalettbesök en vecka efter varje radiofarmaceutisk

läkemedelsbehandling. Skölj toalettstolen 2 gånger efter varje användning. Rengör kroppssekret (urin, avföring, kräkning, svett, blod) från ytorna med engångsdukar och använd engångshandskar.

Kläder och sängkläder som smutsats med kroppssekret ska tvättas separat. Tvätta händerna noggrant efter varje toalettbesök.

Efter att du har fått det radioaktiva behandlingsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under behandlingsdagen.

Använd ett effektivt preventivmedel under den radiofarmaceutiska läkemedelsbehandlingen och i minst 6 månader efter avslutad behandling.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Inga separata avgifter tillkommer för behandlingen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.