

Ektooppisen mahalaukun limakalvon gammakuvaus

Tutkimuksen avulla selvitetään, esiintyykö mahalaukun limakalvoa poikkeavasti muualla ruoansulatuskanavan alueella. Tällainen tila voi aiheuttaa verenvuotoa suolistoon.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 1 – 6 tuntia.

Tutkimus kestää yleensä yhden tunnin. Lisäkuvia voidaan kuitenkin ottaa vielä 3 ja 6 tunnin kuluttua tutkimuksen aloituksesta.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohteessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Älä syö 6 tuntiin tai juo 2 tuntiin ennen tutkimusta.

Lopeta suolistokanavaa ärsyttävien lääkkeiden käyttö 2 – 3 vuorokautta ennen tutkimusta.

Tutkimus

Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli, josta ruiskutetaan pieni määrä radioaktiivista tutkimusainetta verenkiertoon.

Kuvaus gammakameralla aloitetaan välittömästi ja kuvaus kestää noin tunnin. Kuvauksen jälkeen lääkäri määrittelee lisäkuvien tarpeen.

Kuvaus tapahtuu makuuasennossa ja on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuksen jälkeen. Säteilevä merkkiaine poistuu virtsan mukana.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Jos imetät, pidä 12 tunnin imetystauko tutkimusaineen antamisen jälkeen. Lypsä maito tauon loppupuolella ja kaada maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.



Potilasohje
HUS Diagnostiikkakeskus
Isotooppilääketiede

[tutkimukseen.fi](https://www.tutkimukseen.fi)



Potilasohje
HUS Diagnostiikkakeskus
Isotooppilääketiede

[tutkimukseen.fi](https://www.tutkimukseen.fi)