

Keuhkojen alueellisen toiminnan gammakuvaus

Tutkimuksessa selvitetään, miten keuhkoleikkaus vaikuttaa keuhkojen toimintakykyyn.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa 1 tunti.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Syö ja juo sekä ota lääkkeesi normaalisti tutkimuspäivänä. Ota mukaan tiedot käyttämästäsi lääkkeistä ja niiden annostuksesta.

Tutkimus

Aluksi hengität tutkimusainetta annostuslaitteen kautta. Ensimmäinen kuvaus tehdään heti sen jälkeen.

Ensimmäisen kuvauksen jälkeen sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli, josta ruiskutetaan pieni määrä radioaktiivista tutkimusainetta verenkiertoon. Uusi kuvaus tehdään heti sen jälkeen.

Kuvausten ajan olet makuulla ja sinun pitää olla liikkumatta. Kuvaukset ovat kivuttomia.

Tutkimuksen jälkeen

Juo runsaasti nestettä ja virtsaa virtsarakko tyhjäksi tavallista useammin tutkimuksen jälkeen, jotta radioaktiivinen tutkimusaine poistuisi elimistöstä.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Jos imetät, pidä 12 tunnin imetystauko tutkimusaineen antamisen jälkeen. Lypsä maito tauon loppupuolella ja kaada maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.



Potilasohje

Diagnostiikkakeskus
Isotooppilääketiede

www.tutkimukseen.fi