

Lisämunuaiskuoren gammakuvaus

Tutkimuksessa kartoitetaan lisämunuaisen kuorikerroksen toimintaa. Lisäksi kartoitetaan mahdollisten kasvainten vaikutusta lisämunuaisen kuorikerroksen toimintaan.

Tutkimukseen kuuluu 3 – 4 käyntiä isotooppiyksikössä.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuspäivänä syö ja juo sekä ota lääkkeesi normaalisti.

Tutkimus

Sinulle annetaan aluksi natriumperkloraatia. Se estää radioaktiivisen aineen kertymistä kilpirauhaseen ja sylkirauhaseen.

Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli, josta ruiskutetaan pieni määrä radioaktiivista tutkimusainetta verenkiertoon. Kuvaukset gammakameralla tehdään 3, 5 ja 7 vuorokauden kuluttua tutkimusaineen annosta. Tarvittaessa sinulle annetaan suolentyhjennyslääkettä (esimerkiksi Metalax) ennen kuvauksia.

Kuvauksen aikana olet makuuasennossa. Kuvaus on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuksen jälkeen. Säteilevä merkkiaine poistuu virtsan mukana.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Jos imetät, sinun pitää lopettaa imettäminen kokonaan tutkimusaineen antamisen jälkeen.

Vältä raskaaksi tulemista 12 kuukauden ajan tutkimuksen jälkeen.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

