

Sydämen TTR-amyloidoosin gammakuvaus

Tutkimuksen avulla tutkitaan sydänlihaksesi mahdollisten valkuaisainekertymien (amyloidi) määrää ja tyyppiä sydänsairauden poissulkemiseksi tai tarkemmaksi tyypittämiseksi.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 4 tuntia.

Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville. Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon.

Ennen tutkimusta

Syö ja juo sekä ota lääkkeesi normaalisti tutkimuspäivänä.

Tutkimus

Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli josta ruiskutetaan pieni määrä radioaktiivista tutkimusainetta verenkiertoon. Tutkimusaine kertyy sydämeen melko hitaasti, joten kuvaus gammakameralla aloitetaan vasta 2,5 – 4 tunnin kuluttua pistoksesta. Väliaikana voit halutessasi poistua sairaalasta.

Kuvaus kestää 0,5 – 1 tuntia.

Kuvaus on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuspäivän ajan.

Älä imetä 4 tunnin ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Vastauksen tutkimuksesta saat hoitavalta lääkäriltäsi. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Jos et pääse tulemaan sinulle varattuna aikana, ilmoita siitä mahdollisimman pian tutkimuspaikkaasi. Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.

