

Aivojen D2-dopamiinireseptorien gammakuvaus

Tutkimuksessa selvitetään Parkinsonin tautia ja arvioidaan lääkehoidon vaikutusta.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 4 - 5 tuntia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Syö ja juo normaalisti tutkimuspäivänä.

Lopeta neuroleptinen lääkitys 1 viikko ennen tutkimusta. Lopeta L-dopa vähintään 12 tuntia ennen tutkimusta. Muut lääkkeet voit ottaa normaalisti. Ota mukaan tiedot käyttämistäsi lääkkeistä ja niiden annostuksesta.

Tutkimus

Noin 30 minuuttia ennen tutkimusta saat natriumperkloraaattia, joka suojaa kilpirauhasta. Se annostellaan ruiskulla suuhun.

Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli, josta ruiskutetaan pieni määrä radioaktiivista tutkimusainetta verenkiertoon.

Ensimmäinen kuvaus tehdään 30 minuutin ja toinen kuvaus 3 tunnin kuluttua tutkimusaineen antamisen jälkeen.

Kuvauksen ajan olet makuulla ja sinun pitää olla liikkumatta. Kuvauksen aikana kamera kiertää pään ympäri ja se kestää noin 40 minuuttia. Kuvaus on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo runsaasti nestettä ja virtsaa virtsarakko tyhjäksi tavallista useammin tutkimuksen jälkeen, jotta radioaktiivinen tutkimusaine poistuisi elimistöstä.

Älä imetä 3 vuorokauden ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

