

Mahalaukun toiminnan gammakuvaus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mahalaukun tyhjenemishäiriöitä.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 4,5 tuntia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Älä syö tai juo 6 tuntiin ennen tutkimusta.

Älä tupakoi tutkimusaamuna.

Älä ota 2 päivään ennen tutkimusta seuraavia lääkkeitä:

- metoklopramidi (Primperan)
- erytromysiini
- domperidoni (Motilium)
- opioidit (Oxycontin, kodeiini)
- antikolinerginen lääkitys (Robinul).

Ota muut lääkkeet normaalisti.

Tutkimus

Tutkimuspaikassa sinulle annetaan syötäväksi munakaspaahntoleipä. Se sisältää pienen määrän radioaktiivista tutkimusainetta. Jos sinulla on erikoisruokavalio, ilmoita siitä mahdollisimman pian tutkimuspaikkaasi.

Kuvaus gammakameralla aloitetaan heti, kun olet syönyt tutkimusaterian ja se kestää noin minuutin. Sinusta otetaan lisää kuvia 1, 2 ja 4 tunnin kuluttua.

Kuvaus tapahtuu seisten tai istuen ja on kivuton.

Tutkimuksen aikana ei saa syödä, juoda eikä tupakoida.

Tutkimuksen jälkeen

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Älä imetä 12 tunnin ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

