

Radiolääkehoito, Radium²²³

Radium²²³ -hoitoa käytetään aikuisilla eturauhassyövän hoitoon, silloin kun kasvaimen hoitoon ei tehoa miessukupuuhormoneja vähentävä hoito.

Varaa käyntiin aikaa noin 30 minuuttia.

Tutkimukseen valmistautuminen

Hoitopäivänä saat syödä ja juoda sekä ottaa lääkkeesi normaalisti.

Ennen radiolääkehoitoa sinun pitää käydä verikokeissa. Sinua hoitava osasto/poliklinikka antaa tarkemmat ohjeet.

Tutkimus

Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli, josta ruiskutetaan pieni määrä radioaktiivista ainetta verenkiertoon.

Sinulle annetaan radium-223-dikloridiruiske 4 viikon välein 6 kuukauden ajan.

Tutkimuksen jälkeen

Juo runsaasti nestettä ja tyhjennä virtsarakko tavallista useammin hoidon jälkeen säteilyrasituksen pienentämiseksi.

Noudata erityistä huolellisuutta WC-käyntien yhteydessä viikon ajan kunkin radiolääkehoidon jälkeen. Huuhtelee WC-istuim 2 kertaa joka käyttökerran jälkeen. Puhdista kehon eritteet (virtsa, ulosteet, oksennus, hiki, veri) pinnoilta kertakäyttöliinoilla ja käyttämällä kertakäyttökäsineitä.

Pese erikseen kehon eritteistä likaantuneet vaatteet ja vuodevaatteet. Pese kädet hyvin aina WC:ssä käynnin jälkeen.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Käytä tehokasta ehkäisyä radiolääkehoidon aikana ja vähintään 6 kuukauden ajan hoidon loputtua.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Hoidosta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.