

Sappihappojen imeytymistutkimus

Tutkimuksessa selvitetään pitkittyneen ripulin syitä ja sappihappojen imeytymishäiriöitä.

Tutkimuksessa on 2 käyntiä isotooppiyksikössä viikon välein. Varaa ensimmäiseen käyntiin aikaa noin 3 tuntia. Varaa toiseen käyntiin aikaa noin 30 minuuttia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohejeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Saat syödä ja juoda tutkimuspäivänä normaalisti.

Älä ota 2 vuorokauden ruoka-aineiden imeytymiseen vaikuttavia lääkkeitä, esimerkiksi:

- Guarem
- Antepsin
- Alsucral
- Succosa
- Qvestran
- Lestid
- Imodium

Jatka lääketaukoa koko tutkimuksen ajan, yhteensä 9 vuorokautta.

Tutkimus

Sinun pitää niellä veden kanssa kapseli, joka sisältää radioaktiivisen tutkimusaineen.

Ensimmäinen kuvaus tehdään 3 tunnin ja toinen 7 vuorokauden kuluttua tutkimusaineen antamisesta. Molemmat kuvaukset kestävät noin 10 minuuttia.

Kuvaukset tapahtuvat makuuasennossa ja ovat kivuttomia.

Tutkimuksen jälkeen

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Älä imetä 1 vuorokauden ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

