

Sappiteiden gammakuvaus

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää sappiteiden toimintaa ja sairaustiloja.

Varaa aikaa käyntiin noin 6 tuntia.

Jos sinulle on joskus tehty röntgentutkimuksia, joissa on käytetty varjoainetta, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Älä syö tai juo 6 tuntiin ennen tutkimusta. Vastasyntyneet vauvat voivat kuitenkin syödä normaalisti.

Tutkimus

Sinulle laitetaan kanyyli käsivarren laskimoon. Sitä kautta saat pienen määrän radioaktiivista tutkimusainetta.

Kuvaus aloitetaan heti tutkimusaineen antamisen jälkeen ja se kestää noin tunnin. Lisäkuvauksia tehdään tarvittaessa 3 ja 6 tuntia ensimmäisen kuvauksen jälkeen.

Kuvaus tapahtuu makuuasennossa. Kuvaus on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuksen jälkeen. Säteilevä merkkiaine poistuu virtsan mukana.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Älä imetä 12 tunnin ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

