

Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos TT levossa (PET-TT)

Tutkimuksessa selvitetään sydänlihaksen verenkiertoa.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 3 tuntia.

Tutkimusta ei tehdä raskaana oleville. Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon.

Ennen tutkimusta

Ota lääkkeesi normaalisti. Ota mukaan tiedot käyttämästäsi lääkkeistä ja niiden annostuksesta.

Älä käytä alkoholia 1,5 vuorokauteen ennen tutkimusta.

Vältä kovaa räsitusta tutkimusta edeltävänä päivänä.

Älä juo 12 tuntiin ennen tutkimusta juomia, joissa on piristäviä aineita, esim:

- kahvi
- tee
- kaakao
- energijuomat
- kolajuomat



Älä tupakoi 4 tuntiin ennen tutkimusta.

Syö tutkimuspäivänä normaali aamupala tai kevyt lounas, esimerkiksi keitto tai salaatti.

Tutkimus

Tutkimus alkaa 15 – 30 minuutin levolla osaston tiloissa. Sinulle laitetaan kanyyli käsivarren laskimoon. Sitä kautta saat pienen määrän radioaktiivista merkkiainetta. Merkkiaineen antamisen jälkeen on 1 tunnin lepo ennen kuvausta.

Kuvaus kestää noin 30 minuuttia. Kuvauksessa makaat selällään kädet ojennettuina pään yläpuolelle.

Kuvaus on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuksen jälkeen.

Älä imetä 12 tunnin ajan tutkimusaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

