

Sylkirauhasten gammakuvaus

Tutkimuksen avulla selvitetään sylkirauhasen toimintaa ja paikannetaan mahdollisia kasvaimia.

Tutkimus kestää noin 1,5 tuntia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda sekä ottaa lääkkeesi normaalisti.

Tutkimus

Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli, josta ruiskutetaan pieni määrä radioaktiivista tutkimusainetta verenkiertoon.

Tutkimusaine kertyy sylkirauhasiin ja erittyy syljen mukana suuhun. Kuvaus gammakameralla alkaa välittömästi ja kestää noin tunnin.

Kuvauksen aikana sinulle annetaan tarvittaessa syljen eritystä kiihdyttävää ainetta, esimerkiksi sitruunamehua.

Kuvaus tapahtuu makuuasennossa ja on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo tavallista enemmän nestettä ja käy usein virtsalla tutkimuksen jälkeen. Säteilevä merkkiaine poistuu virtsan mukana.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Älä imetä 2 vuorokauden ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

