

Vartijaimusolmukkeen paikantaminen gammakuvauksella, rinta

Tutkimuksessa selvitetään vartijaimusolmukkeiden sijainti. Tutkimuksella ei saada selvitettyä taudin levinneisyyttä. Tutkimuksessa löytyneet imusolmukkeet otetaan leikkauksessa kudoksenäytteiksi.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 3 tuntia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Syö ja juo sekä ota lääkkeesi normaalisti tutkimuspäivänä.

Tutkimus

Pieni määrä radioaktiivista merkkiainetta annetaan pistoksena ihon alle kasvaimen lähelle. Merkkiaine hakeutuu imuteitä pitkin vartijaimusolmukkeisiin.

Jos kasvaimen on laitettu lanka-merkkkaus (väkäpäinen metallilanka), pistos annetaan röntgenosastolla. Eksoten alueella pistos annetaan isotooppiyksikössä.

Jos kasvaimen on laitettu jyvä-merkkkaus (radioaktiivinen merkkkausjyvä), pistos annetaan isotooppiyksikössä.

Kuvaus alkaa noin 2 tuntia pistoksesta. Kuvaus kestää noin 15 minuuttia.

Kuvaus tapahtuu makuuasennossa. Kuvaus on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Älä imetä 1 päivän ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.