

Vartijaimusolmukkeen SPET ja matala-annos TT

Tutkimuksessa selvitetään vartijaimusolmukkeiden sijainti. Tutkimuksella ei saada selvitettyä taudin levinneisyyttä. Tutkimuksessa löytyneet imusolmukkeet otetaan leikkauksessa kudosnäytteiksi.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 1 tunti.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisoheessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Syö ja juo sekä ota lääkkeesi normaalisti tutkimuspäivänä.

Tutkimus

Pieni määrä radioaktiivista merkkiainetta annetaan pistoksena ihon alle kasvaimen lähelle. Merkkiaine hakeutuu imuteitä pitkin vartijaimusolmukkeisiin.

Jos kasvain on jo poistettu, pistetään merkkiaine poistoarven molemmin puolin.

Kuvaus aloitetaan heti pistoksen jälkeen. Kuvaus kestää noin 1 tunnin. Löytyneiden imusolmukkeiden sijainti merkitään iholle tussikynällä. Merkkejä ei saa pestä pois.

Tutkimuksen yhteydessä tehdään mahdollisesti myös elimistön rakenteita

kuvaava TT-kuvaus (tietokonetomografia), jonka avulla mahdolliset muutokset pystytään paikantamaan tarkasti. Kuvaukset tehdään samanaikaisesti. Kuvaus tapahtuu makuuasennossa. Kuvaus on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Älä imetä 1 päivän ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

