

## Hjärnans perfusions isotopundersökning

I undersökningen utreds hjärnfunktionen.

Reservera cirka 1– 1,5 timmar för undersökningen.

Om du är gravid eller misstänker att du är gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs vanligtvis inte på gravida.

### Före undersökning

På undersökningsmorgonen kan du äta och dricka normalt och ta dina mediciner som vanligt. Ta med dig information om dina läkemedel och deras dosering.

### Undersökning

Du får en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen.

Undersökningen inleds med gammakamera direkt eller senast 30 minuter efter administrering av undersökningsämnet. Undersökningen tar cirka 30 minuter. Under undersökningen ligger du på rygg och du måste vara orörlig. Undersökningen är smärtfri.

### Efter undersökning

Du ska dricka mer än vanligt samt tömma urinblåsan ofta för att minska strålbekastningen.

Ammande mödrar bör ha 1 dygns avbrott i amningen efter undersökningen. All mjölk som pumpats ut under avbrottet hålls bort.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Om inte den reserverade undersökningen annulleras uppbärs en separat straffavgift.

