

Isotopundersökning av lungventilation och -perfusion

I undersökningen utreds orsaken till andnöd eller en möjlig blodpropp i lungan.

Reservera cirka 1 timme för undersökningen.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs i regel inte till kvinnor som är gravida.

Före undersökningen

Du får äta och dricka normalt samt ta dina läkemedel som vanligt. Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Under undersökningen

I början andas du in undersökningsämnet via en doseringsapparat. Den första bildtagningen genomförs direkt därefter. Bildtagningen tar cirka 20 minuter.

Efter den första bildtagningen får du en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen. Den nya bildtagningen genomförs direkt därefter och den tar cirka 10 minuter. Under bildtagningarna ligger du på rygg och du måste vara orörlig. Bildtagningarna är smärtfria.

Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan oftare än normalt efter undersökningen så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Efter att du har fått det radioaktiva läkemedlet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

Amma inte på ett dygn efter att undersökningsmedlet har tilldelats. Om du har mjölkat under pausen, håll mjölken i avloppet.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

