

## Radiofosforbehandling

Radiofosfor används vid behandling av blodsjukdomar där mängden blodceller är ovanligt hög.

Behandlingen tar cirka 15 minuter.

### Före behandlingen

Du får äta och dricka normalt samt ta dina läkemedel som vanligt.

Drick vätskor (t.ex. vatten eller juice) minst 2 liter per dag i 2 dagar före behandlingen. Behandlingen belastar njurarna och kan orsaka gikt om du har en tendens till gikt. Att dricka tillräckligt minskar biverkningarna.

Om du har njursjukdomar, diskutera med din läkare om du behöver börja ta Apurin® under behandlingen för att skydda dina njurar.

### Under behandlingen

Du får en venkanyl i armen och genom den injicerar läkaren radioaktiv radiofosfor i blodet.

Radiofosfor samlas i benmärgen, där den minskar produktionen av röda blodkroppar och blodplättar. Effekten av behandlingen kan ofta bedömas först efter 2–3 månader.

### Efter behandlingen

Radiofosfor strålar inte ut i omgivningen, så behandlingen medför ingen fara för andra människor.

Under dagarna efter behandlingen är det viktigt att dricka minst 2 liter vätska (t.ex. vatten eller juice) om dagen.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Inga separata avgifter tillkommer för behandlingen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokat kommer du att debiteras en straffavgift.

