

Isotopundersökning av TTR-amyloidos i hjärtat

Med hjälp av undersökningen undersöks mängd och ansamling av olösliga proteiner (amyloid) i hjärtmuskeln för att utesluta hjärtsjukdom eller för att klassificera mer noggrant.

Reservera cirka 4 timmar för undersökningen.

Om du är gravid eller misstänker att du är gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Behandlingen ges vanligtvis inte till kvinnor som är gravida.

Före undersökning

Ät och drick samt ta dina läkemedel som vanligt på undersökningdagen.

Undersökning

Du får en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen. Undersökningsämnet ansamlas i hjärtat ganska långsamt och därför inleds undersökningen med gammakamera först 2,5 – 4 timmar efter injiceringen. Under tiden däremellan kan du avlägsna dig från sjukhuset om du vill.

Undersökningen tar 0,5 – 1 timmar.

Bildtagning är smärtfri.

Efter undersökning

Du ska dricka mer än vanligt samt tömma urinblåsan ofta.

Amma inte på 4 timmar efter undersökningen. Om du har mjölkat under pausen, håll mjölken i avloppet.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Undersökningresultatet får du av den behandlade läkaren. Om du inte har fått en mottagningstid eller telefontid, kontakta den vårdande enheten.

Om du inte kan komma till undersökningen, vänligen rapportera det så snart som möjligt till din provning ställe. Om inte den reserverade undersökningen annulleras uppbärs en separat straffavgift.

