

Hjärtmuskelperfusion SPET och lågdos DT i vila och ansträngning (2-dagars protokoll)

Undersökningen granskar blodflödet i hjärtmuskeln.

Undersökningen inkluderar två besök på olika dagar. Den första dagen kommer du att ha ett ansträngning test och en scintigrafi. På den andra dagen kommer du att få ett vilotest.

Undersökningen tar ungefär 2 timmar på båda dagarna.

Om du är gravid eller misstänker att du är gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen görs inte på gravida.

Förberedelse för undersökningen

2 dygn före ansträngning test

Uppehåll med läkemedel

Om du inte har kranskärslsjukdom ska du inte ta följande läkemedel på 2 dygn före undersökningen:

- betablockerare
- kalciumantagonister
- långverkande nitro
- Asasantin®, Persantin® och Orisantin®

Om du har kranskärslsjukdom ska du inte ta följande läkemedel på 2 dygn före undersökningen:

- Asasantin®, Persantin® och Orisantin®

Om din läkare har gett dig en annan anvisning för avbrott med läkemedel, följ den.

Ta med information om de läkemedel du använder.

Drick inte alkohol på 2 dygn före undersökningen.

Ett dygn före ansträngning test

Utför ingen ansträngande träning så att du orkar cykla i ansträngningstestet.

Drick inte drycker som innehåller uppiggande ämnen på 12 timmar före undersökningen, t.ex.:

- kaffe
- te
- kakao
- energidrycker
- cola-drycker



Uppiggande ämnen utgör hinder för undersökningen!

På ansträngning testdagen

Före undersökningen kan du äta frukost eller en lätt lunch, till exempel soppa eller sallad.

Rök inte på 4 timmar före undersökningen eller när den pågår.

Ta med skor och byxor som är bra att cykla i.

På vilotestdagen

Du kan äta, dricka och ta din medicin normalt.

Undersökning

Ansträngning i första dag

Du får en kanyl i armvenen. Därigenom får du en liten mängd radioaktiva markörer.

I ansträngningstestet cyklar du. Om tillräcklig ansträngning inte lyckas på cykeln, ansträngs ditt hjärta med medicin. Läkaren vid undersökningen avgör detta.

Efter ansträngning undersöks du samtidigt med både gammakamera (SPET) och DT-enhet (datortomografi). Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Vid undersökningen ligger du på rygg med händerna utsträckta ovanför huvudet.

Vila i andra dag

Utför ingen ansträngande träning dagen före eller på testdag.

Undersökning inkluderar vila i undersökningsställets väntrum i 1 timme. Under vilofasen får du en kanyl i armvenen och en liten mängd radioaktiva spårämnen.

Efter vilan görs en ny undersökning. Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Vid undersökningen ligger du på rygg med händerna utsträckta ovanför huvudet.

Efter undersökningen

Det radioaktiva markörämnet försvinner med urinen. Drick mer vätska än vanligt och kissa ofta under hela undersökningsdagen.

Amma inte på 12 timmar efter administrering av markörämne. Om du under pausen har mjölkat, håll mjölken i avloppet.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningsdagen.

Observera

Mer information om läkemedlen som anges i denna anvisning finns på adressen www.laakeinfo.fi. Du kan också fråga den vårdande läkaren.

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultatet, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Ingen separat avgift tas ut för undersökningen. Avboka tiden om du inte kan komma. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.