

Hjärtmuskelperfusion SPET med låg dos DT i vila (PET med DT)

I undersökningen utreds blodcirkulationen i hjärtmuskeln.

Reservera cirka 3 timmar för undersökningen.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstinstruktionerna. Undersökningen utförs i regel inte vid graviditet.

Före undersökning

Ta dina läkemedel som vanligt. Ta med dig information om dina läkemedel och deras dosering.

Konsumera ingen alkohol 1,5 dygn innan undersökningen.

Undvik kraftig ansträngning dagen innan undersökningen.

Drick inga drycker som innehåller uppiggande medel 12 timmar innan undersökningen, t.ex.:

- kaffe
- te
- kakao
- energidrycker
- coladrycker



Rök inte 4 timmar innan undersökningen.

Ät ett normalt morgonmål eller en lätt lunch, till exempel en soppa eller sallad.

Undersökning

Undersökningen inleds med 15 – 30 minuters vila på avdelningen. Vid det du en kanyl i venen i armen. Via den får du en liten mängd radioaktiv spårsubstans. Efter administreringen av undersökningsmedlet, 1 timmes vila innan undersökningen.

Undersökningen tar cirka 30 minuter. Du ligger på rygg med armarna sträckta ovanför huvudet. Bildtagning är smärtfri.

Efter undersökning

Du ska dricka mer än vanligt samt tömma urinblåsan ofta för att minska strålbekastningen.

Amma inte på 12 timmar efter undersökningen. Om du har mjölkat under pausen, håll mjölken i avloppet.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningsdagen.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig. Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen. Om inte den reserverade undersökningen annulleras uppbärs en separat straffavgift.

