

## Isotopundersökning av spottkörtel

Undersökningen utreder spottkörtelns funktion och lokaliserar eventuella tumörer.

Reservera cirka 1,5 timmar för besöket.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs i regel inte vid graviditet.

### Förberedelse för undersökningen

På undersökningsmorgonen kan du äta och dricka normalt och ta dina mediciner som vanligt.

### Undersökning

Du får en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen.

Undersökningsämnet samlas i spottkörtlarna och utsöndras i munnen med saliven. Undersökningen genomförs direkt efter det och den tar cirka en timme.

Under undersökningen ges vid behov ett salivstimulerande medel, till exempel citronsaft.

Under bildtagningen skall du ligga på rygg på undersökningsbordet. Bildtagningen är smärtfri.

### Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan oftare än normalt så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

Amma inte på två dygn efter att undersökningsmedlet har tilldelats. Om du har mjölkat under pausen, håll mjölken i avloppet.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

