

## Lymfkörtel SPET och lågdos DT

I undersökningen utreds portvaktskörtlarnas placering. Sjukdomens spridning kan inte utredas genom undersökningen.

Lymfkörtlarna som har hittats genom undersökningen operas för att användas som vävnadsprover.

Reservera cirka 1 timma för undersökningen.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstinstruktionerna. Undersökningen utförs i regel inte vid graviditet.

### Före undersökningen

Ät och drick samt ta dina läkemedel som vanligt på undersökningsdagen.

### Undersökning

En liten mängd radioaktiv läkemedlet injiceras under huden nära tumören. Spårsubstansen söker sig via lymfkärlen till portvaktarkörtlarna.

Om tumören har avlägsnats injiceras läkemedlet på båda sidor om ärret efter borttagningen.

Bildtagningen inledas omedelbart efter injektionen. Undersökningen tar cirka 1 timma. Placering av de funna lymfkörtlarna markeras med en tuschpenna

på huden. Man får inte tvätta bort markeringarna.

Under bildtagningen skall du ligga på rygg på undersökningsbordet. Bildtagning är smärtfri.

### Efter undersökningen

Ammande mödrar bör ha 1 dygns avbrott i amningen efter undersökningen. All mjölk som pumpats ut under avbrottet hålls bort.

Efter att du har fått det radioaktiva läkemedlet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningsdagen.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Om inte den reserverade undersökningen annulleras uppbärs en separat straffavgift.

