

Diffuusiokapasiteetti

Tutkimuksen avulla selvitetään keuhkojen toimintaa.

Tutkimus kestää noin 30-45 minuuttia.

Ennen tutkimusta

Sinun pitää olla:

- **4 tuntia** ilman kahvia, teetä, kolapitoisia juomia ja energiajuomia
- **4 tuntia** ilman raskasta ateriala
- **2 tuntia** tupakoimatta
- **1 vrk** ilman alkoholia

Kevyen aterian voi syödä.

Vältä voimakasta fyysistä rasitusta noin 2 tuntia ennen tutkimusta.

Ota lääkkeet oman lääkärin ohjeiden mukaisesti. Ota reseptit tai tiedot lääkkeistäsi mukaan tutkimukseen.

Tutkimus

Tutkimuksessa hengität rauhallisesti ja/tai puhallat voimakkaasti suukappaleeseen. Puhallukset voivat tuntua lievästi rasittavilta.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Jos et pääse tulemaan sinulle varattuna aikana, sairastut ennen tutkimusta hengitystieinfektioon (esim. flunssa, nuha) tai johonkin muuhun äkilliseen sairauteen, ilmoita siitä mahdollisimman pian tutkimuspaikkaasi. Tutkimus voidaan tehdä vasta noin kahden viikon kuluttua hengitystietulehduksen paranemisesta.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.



Potilasohje
Diagnostiikkakeskus
Kliininen fysiologia

www.tutkimukseen.fi

Voimaantulopäivä: 17.8.2023

Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti

Tutkimus: 1246 Pt-DcoSB1 Diffuusiokapasiteetti, single breath menetelmä, tavallinen perusmittaus, 22083 Pt-DcoSB-X
Diffuusiokapasiteetti, kertahengitysmenetelmä, ilman lausuntoa

Tunniste: 6279