

Esofaguksen ja kardian paineenmittaus

Tutkimuksessa selvitetään ruokatorven toimintahäiriöitä.

Tutkimus kestää noin 1 tunnin.

Tutkimukseen valmistautuminen

Ennen tutkimusta sinun pitää olla

- **4 tuntia** syömättä ja juomatta (lasin vettä voi juoda)
- **12 tuntia** ilman rauhoittavia lääkkeitä
- **48 tuntia** ilman voimakkaita särkylääkkeitä (kolmiolääkkeitä)
- **1,5 vrk** ilman alkoholia

Jos sinulla on insuliinidiabetes ja sinua hoitava lääkäri on antanut erilaisen ohjeen valmistautumisesta, noudata sitä.

Lääkitys:

- 12 h ilman:** Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.
- Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. **vrk ilman:** Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä.

Tai:

- Voit ottaa lääkkeesi normaalisti

Ota reseptit tai tiedot lääkkeistäsi mukaan tutkimukseen.

Tutkimus

Tutkimuksessa ei anneta esilääkitystä (diatsepaamivalmisteet tai vastaavat) eikä sitä voi tehdä nukutuksessa.

Sinulle laitetaan pieni määrä geeliä sieraimeen. Sieraimen kautta laitetaan ohut ja taipuisa katetri ruokatorven kautta mahalaukkuun.

Tutkimuksessa on eri vaiheita. Sinua pyydetään välillä olemaan hetki nielemättä. Välillä sinulle annetaan ruiskulla pieni määrä vettä tai mietoa suolaliuosta suuhun ja sinun pitää niellä se. Tutkimus ei aiheuta kipua, mutta se voi olla epämiellyttävä. Tutkimuksen jälkeen voi esiintyä limakalvoärsytystä.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Jos et pääse tulemaan sinulle varattuna aikana, ilmoita siitä mahdollisimman pian tutkimuspaikkaasi.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Peru aika, jos et pääse tulemaan.