

Nitrografia

Tutkimuksen avulla selvitetään keuhkojen toimintaa.

Tutkimus kestää noin 30 - 45 minuuttia.

Ennen tutkimusta

Sinun pitää olla:

- **4 tuntia** ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja energiajuomia
- **4 tuntia** ilman raskasta ateriaa
- **2 tuntia** tupakoimatta
- **1 vrk** ilman alkoholia

Kevyen aterian voi syödä.

Vältä voimakasta fyysistä rasitusta noin 2 tuntia ennen tutkimusta.

Lääkitys

Voit ottaa lääkkeit normaalisti

Lääketauko liitteen mukaisesti

Lääkkeet oman lääkärin ohjeiden mukaisesti

Ota muut kuin hengitystiesairauksiin määrätyt lääkkeet normaalisti.

Ota reseptit tai tiedot lääkkeistäsi mukaan tutkimukseen.

Tutkimus

Tutkimuksessa hengität rauhallisesti ja/tai puhallat voimakkaasti suukappaleeseen. Puhallukset voivat tuntua lievästi rasittavilta.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Jos et pääse tulemaan sinulle varattuna aikana, sairastut ennen tutkimusta hengitystieinfektioon (esim. flunssa, nuha) tai johonkin muuhun äkilliseen sairauteen, ilmoita siitä mahdollisimman pian tutkimuspaikkaasi. Tutkimus voidaan tehdä vasta noin kahden viikon kuluttua hengitystietulehduksen paranemisesta.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

Diagnosiin keuhkofunktio tutkimuksiin vaikuttavat lääkkeet

Kun tutkitaan keuhkojen toimintaa ilman lääkevaikutusta, tutkittavan pitäisi olla **ilman** seuraavia lääkkeitä vähintään **alla mainittu aika**.

<p>Accolate 3 vrk Adrenalin, Epipen 12 h Aerobec 4 vkoa Aiomir 12 h Alvesco 4 vkoa Aminocont 3 vrk Anoro 3 vrk Asmanex 4 vkoa Astecon 3 vrk Atro dual 24 h Atrovent 24 h Atrovent comp 24 h</p> <p>Beclomet 4 vkoa Bricanyl 12 h Budenofalk 4 vkoa Budesonid(e) 4 vkoa <input type="checkbox"/> Bufomix 2 vrk <input type="checkbox"/> Bufomix 4 vkoa Buventol 12 h</p> <p>Cykloterol 2 vrk</p> <p>Daxas 5 vrk Dexametason 4 vkoa Duaklir 2 vrk</p>	<p>Efedrin 12 h Efedriini 12 h Efedriini hydrokloridi 12 h Eklira 2 vrk Entocort 4 vkoa Euphylong 3 vrk</p> <p>Flixotide 4 vkoa Flutide 4 vkoa <input type="checkbox"/> Flutiform 2 vrk <input type="checkbox"/> Flutiform 4 vkoa</p> <p>Fomeda 2 vrk Foradil 2 vrk Formaxa 2 vrk Formoterol 2 vrk</p> <p>Hydrocortison 4 vkoa *</p> <p>Incruse 3 vrk <input type="checkbox"/> Innovair 2 vrk <input type="checkbox"/> Innovair 4 vkoa</p> <p>Ipraxa 24 h Ipramol 24 h Inspiolto 7 vrk</p>	<p>Lomudal 12 h</p> <p>Medrol 4 vkoa * Montelukast 3 vrk Novopulmon 4 vkoa</p> <p>Onbrez 7 vrk Oxis 2 vrk</p> <p>Prednisolon 4 vkoa * Prednison 4 vkoa * Pulmicort 4 vkoa</p> <p>Racinephrine 12 h <input type="checkbox"/> Relvar 3 vrk <input type="checkbox"/> Relvar 4 vkoa</p> <p>Retafyllin 3 vrk Rinexin 12 h</p> <p>Salbutamol 12 h Seebri 12 vrk <input type="checkbox"/> Seretide 2 vrk <input type="checkbox"/> Seretide 4 vkoa</p> <p>Serevent 2 vrk Singulair 3 vrk Solomet 4 vkoa *</p>	<p>Spiriva 4 vrk Striverdi 7 vrk <input type="checkbox"/> Symbicort 2 vrk <input type="checkbox"/> Symbicort 4 vkoa</p> <p>Theofol 3 vrk Theofol comp 3 vrk Theofylliini 3 vrk Tilade 24 h</p> <p>Ultibro 12 vrk</p> <p>Ventilastin 12 h Ventoline 12 h</p> <p>Yskänlääkkeet kaikki 3 vrk</p> <p>* tauko vain jos kuuluvat astman tai keuhkohtaumataudin (COPD) hoitoon</p>
--	---	--	---