

Rhinomanometria supistavalla lääkkeellä

Tutkimuksessa mitataan nenän ilmateiden virtausta ja virtausvastusta.

Varaa tutkimukseen aikaa noin 45 minuuttia.

Ennen tutkimusta

Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda normaalisti.

Älä tupakoi tuntiin ennen tutkimusta.

Pidä yhden vuorokauden tauko nenäoireiden hoitoon käytettävistä lääkkeistä. Älä käytä tutkimuspäivänä mitään nenäsuihkeita, nenävoiteita tai nenähuuhtelukannua.

Jotta tutkimustulokset olisivat luotettavia, saavu paikalle 15-30 minuuttia ennen tutkimusta ja istu rauhassa odotustilassa.

Tutkimus

Tutkimuksessa hengität mittausmaskin kautta siten, että sieraimet ovat vuorotellen tukittuna vaahtomuovitulpalla. Mittausten välillä saat myös nenäsumutetta, jonka jälkeen mittaukset uusitaan.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Jos et pääse tulemaan sinulle varattuna aikana, sairastut ennen tutkimusta hengitystieinfektioon (esim. flunssa, nuha) tai johonkin muuhun äkilliseen sairauteen, ilmoita siitä mahdollisimman pian tutkimuspaikkaasi. Tutkimus voidaan tehdä vasta noin kahden viikon kuluttua hengitystietulehduksen paranemisesta.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.