

Uloshengityskaasun typpioksidianalyysi

Sinulle on varattu aika uloshengityskaasun typpioksidianalyysiin.

Typpioksiditutkimuksessa mitataan uloshengitysilman typpioksidia. Sitä on uloshengitysilmassa aina vähäisiä määriä, mutta kaikissa tulehduksellisissa sairauksissa esimerkiksi astmassa sen määrä kasvaa selvästi.

Tutkimus kestää yleensä 20 minuuttia.

Tutkimukseen valmistautuminen

Ennen tutkimusta sinun pitää olla:

- 4 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia ja energijuomia sekä raskasta ateriaa
- 2 tuntia tupakoimatta
- 1 vrk ilman alkoholia

Kevyen aterian voi syödä.

Lääkitys

- Voit ottaa lääkkeet normaalisti
- Lääketauko ohessa olevan liitteen mukaisesti
- Lääkkeet oman lääkärin ohjeiden mukaisesti

Ota muut kuin hengitystiesairauksiin määrätyt lääkkeet aina normaalisti.

Ota reseptit tai tiedot lääkkeistäsi mukaan tutkimukseen.

Vältä voimakasta fyysistä rasitusta noin 2 tuntia ennen tutkimusta.

Tutkimus

Mittauksen aikana puhalletaan 2 pitkää uloshengitystä suukappaleeseen hoitajan ohjeiden mukaan.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Vastauksen tutkimuksesta saat hoitavalta lääkäriltäsi. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Jos et pääse tulemaan sinulle varattuna aikana, sairastut ennen tutkimusta hengitystieinfektioon (esim. flunssa, nuha) tai johonkin muuhun äkilliseen sairauteen, ilmoita siitä mahdollisimman pian tutkimuspaikkaasi. Tutkimus voidaan tehdä vasta noin kahden viikon kuluttua hengitystietulehduksen paranemisesta.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme sinulta maksun.

Keuhkojen toimintakokeisiin vaikuttavat lääkkeet

Kun halutaan tutkia keuhkojen toimintaa ilman lääkevaikutusta, sinun pitäisi olla ilman seuraavia lääkkeitä vähintään alla mainittu aika.

Accolate 3 vrk Adrenalin, Epipen 12 h Aerobec 4 vkoa Airomir 12 h Alvesco 4 vkoa Aminocont 3 vrk Anoro 3 vrk Asmanex 4 vkoa Astecon 3 vrk Atrodual 24 h Atrovent 24 h Atrovent comp 24 h Beclomet 4 vkoa Bricanyl 12 h Budenofalk 4 vkoa Budesonid(e) 4 vkoa <input type="checkbox"/> Bufomix 2 vrk <input type="checkbox"/> Bufomix 4 vkoa Buventol 12 h Cykloterol 2 vrk Daxas 5 vrk Dexametason 4 vkoa Duaklir 2 vrk	Efedrin 12 h Efedriini 12 h Efedriini hydrokloridi 12 h Eklira 2 vrk Entocort 4 vkoa Euphyllong 3 vrk Flixotide 4 vkoa Flutide 4 vkoa <input type="checkbox"/> Flutiform 2 vrk <input type="checkbox"/> Flutiform 4 vkoa Fomeda 2 vrk Foradil 2 vrk Formaxa 2 vrk Formoterol 2 vrk Hydrocortison 4 vkoa * Incruse 3 vrk <input type="checkbox"/> Innovair 2 vrk <input type="checkbox"/> Innovair 4 vkoa Ipraxa 24 h IpramoL 24 h Inspiolto 7 vrk	Lomudal 12 h Medrol 4 vkoa * Montelukast 3 vrk Novopulmon 4 vkoa Onbrez 7 vrk Oxis 2 vrk Prednisolon 4 vkoa * Prednison 4 vkoa * Pulmicort 4 vkoa Racinephrine 12 h <input type="checkbox"/> Relvar 3 vrk <input type="checkbox"/> Relvar 4 vkoa Retafyllin 3 vrk Rinexin 12 h Salbutamol 12 h <input type="checkbox"/> Salflumix 4 vkoa <input type="checkbox"/> Salflumix 48 h <input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason 4 vkoa <input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason 48 h Seebri 12 vrk <input type="checkbox"/> Seretide 2 vrk <input type="checkbox"/> Seretide 4 vkoa Serevent 2 vrk Singulair 3 vrk Solomet 4 vkoa *	Spiriva 4 vrk Striverdi 7 vrk <input type="checkbox"/> Symbicort 2 vrk <input type="checkbox"/> Symbicort 4 vkoa Theofol 3 vrk Theofol comp 3 vrk Theofylliini 3 vrk Tilade 24 h <input type="checkbox"/> Trelegy 3 vrk <input type="checkbox"/> Trelegy 4 vkoa <input type="checkbox"/> Trimbaw 12 vrk <input type="checkbox"/> Trimbaw 4 vkoa Ultibro 12 vrk Ventilastin 12 h Ventoline 12 h Yskänlääkkeet 3 vrk * tauko, jos kuuluvat astman tai keuhkohtaumataudin (COPD) hoitoon
---	---	---	--