

Mätning av blodcirkulation i de nedre extremiteterna i belastning

Med hjälp av undersökningen utreds störningar i blodcirkulationen i de nedre extremiteterna.

Undersökningen tar cirka 1,5 timmar.

Förberedelse för undersökningen

Var innan undersökningen:

- **4 timmar** utan kaffe, te, coladrycker och energidrycker
- **4 timmar** utan att äta en kraftig måltid
- **2 timmar** utan att röka
- **1 dygn** utan alkohol

Du kan äta en lätt måltid.

Undvik kraftig fysisk ansträngning cirka 2 timmar innan undersökningen.

Tvätta dina fötter hemma före undersökningen.

Avlägsna nagellack eller lösnageln från långfingret på båda händerna.

Ta med dig shorts eller löst sittande byxor. Ta också med dig lämpliga skor, till exempel löparskor.

Ta dina läkemedel enligt din egen läkares instruktioner. Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Undersökning

Undersökningen mäts blodtrycket i alla extremiteter i vila. Efter mätningar får du gå två minuter på ett löpband. Blodtrycket mäts i extremiteterna efter gåendet. Flera mätningar görs.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

