

Bodypletysmografi

Med hjälp av undersökningen utreds lungfunktionen.

Undersökningen tar cirka 30 - 45 minuter.

Före undersökningen

Var innan undersökningen:

- **4 timmar** utan kaffe, te, coladrycker och energidrycker
- **4 timmar** utan att äta en kraftig måltid
- **2 timmar** utan att röka
- **1 dygn** utan alkohol

Du kan äta en lätt måltid.

Undvik kraftig fysisk ansträngning cirka 2 timmar innan undersökningen.

Läkemedelsbehandling

- Du kan ta dina läkemedel som vanligt
- Läkemedelsuppehåll enligt bilagan
- Läkemedel enligt din egen läkares instruktioner

Ta som vanligt alla andra läkemedel utom de som har ordinerats för sjukdomar i andningsvägarna.

Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Undersökning

Under undersökningen får du andas lugnt och/eller blåsa kraftigt i ett munstycke. Blåsningarna kan kännas lindrigt ansträngande.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Om du får en luftvägsinfektion (t.ex. förkyld, snuva) innan undersökningen eller någon annan plötslig sjukdom ska du meddela det så fort som möjligt till ditt undersökningsställe. Undersökningen kan genomföras först cirka två veckor efter tillfriskning från luftvägsinfektionen.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

Läkemedel som påverkar lungfunktionstesterna

När lungfunktionen undersöks utan läkemedelspåverkan ska du vara utan dessa läkemedel under åtminstone den nedan nämnda tiden.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Accolate 3 dygn | Efedrin 12 t | Lomudal 12 t | Spiriva 4 dygn |
| Adrenalin, Epipen 12 t | Efedriini 12 t | Medrol 4 veckor * | Striverdi 7 dygn |
| Aerobec 4 veckor | Efedriini hydrokloridi 12 t | Montelukast 3 dygn | <input type="checkbox"/> Symbicort 2 dygn |
| Airomir 12 t | Eklira 2 dygn | Novopulmon 4 veckor | <input type="checkbox"/> Symbicort 4 veckor |
| Alvesco 4 veckor | Entocort 4 veckor | Onbrez 7 dygn | Theofol 3 dygn |
| Aminocont 3 dygn | Euphyllong 3 dygn | Oxis 2 dygn | Theofol comp 3 dygn |
| Anoro 3 dygn | Flixotide 4 veckor | Prednisolon 4 veckor * | Theofyllini 3 dygn |
| Asmanex 4 veckor | Flutide 4 veckor | Prednison 4 veckor * | Tilade 24 t |
| Astecon 3 dygn | <input type="checkbox"/> Flutiform 2 dygn | Pulmicort 4 veckor | <input type="checkbox"/> Trelegy 3 dygn |
| Atro dual 24 t | <input type="checkbox"/> Flutiform 4 veckor | Racinephrine 12 t | <input type="checkbox"/> Trelegy 4 veckor |
| Atrovent 24 t | Fomeda 2 dygn | <input type="checkbox"/> Relvar 3 dygn | <input type="checkbox"/> Trimbrow 12 dygn |
| Atrovent comp 24 t | Foradil 2 dygn | <input type="checkbox"/> Relvar 4 veckor | <input type="checkbox"/> Trimbrow 4 veckor |
| Beclomet 4 veckor | Formaxa 2 dygn | Retafyllin 3 dygn | Ultibro 12 dygn |
| Bricanyl 12 t | Formoterol 2 dygn | Rinexin 12 t | Ventilastin 12 t |
| Budenofalk 4 veckor | Hydrocortison 4 veckor | Salbutamol 12 t | Ventoline 12 t |
| Budesonid(e) 4 veckor | * | <input type="checkbox"/> Salflumix 4 veckor | Hostmediciner 3 dygn |
| <input type="checkbox"/> Bufomix 2 dygn | Incruse 3 dygn | <input type="checkbox"/> Salflumix 48 t | |
| <input type="checkbox"/> Bufomix 4 veckor | <input type="checkbox"/> Innovair 2 dygn | <input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason 4 veckor | |
| Buventol 12 t | <input type="checkbox"/> Innovair 4 veckor | <input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason 48 t | |
| Cykloterol 2 dygn | Ipraxa 24 t | Seebri 12 dygn | |
| Daxas 5 dygn | Ipramol 24 t | <input type="checkbox"/> Seretide 2 dygn | |
| Dexametason 4 veckor | Inspiolto 7 dygn | <input type="checkbox"/> Seretide 4 veckor | |
| Duaklir 2 dygn | | Serevent 2 dygn | |
| | | Singulair 3 dygn | |
| | | Solomet 4 veckor * | |

* uppehåll, om de ingår i behandlingen av astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)