

Tryckmätning av esofagus och cardia

Med hjälp av undersökningen utreds funktionsstörning i matstrupen.

Undersökningen tar cirka 60 minuter.

Förberedelse för undersökningen

Var innan undersökningen

- **4 timmar** utan att äta och dricka (du kan dricka ett glas vatten)
- **12 timmar** utan lugnande läkemedel
- **48 timmar** utan starka smärtstillande läkemedel (läkemedel med en varningstriangel)
- **1,5 dygn** utan alkohol

Om du har insulinbehandlad diabetes och din behandlande läkare har gett dig en annan anvisning angående förberedelserna ska du följa den.

Läkemedelsbehandling

12 timmar utan: _____

___ dygn utan: _____

Eller:

Du kan ta dina läkemedel som vanligt.

Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Undersökning

Du får ingen ytterligare förmedicinering under undersökningen (diazepampreparaten eller motsvarande) och den kan inte göras under anestesi.

Du får en liten mängd gel i näsborren. Via näsborren insätts en tunn och böjlig kateter via matstrupen i magsäcken.

I undersökningen förekommer olika skeden. Du ombeds att vara under ett ögonblick utan att svälja. Ibland får du en liten mängd vatten eller svag saltlösning i munnen med spruta och du måste svälja den. Undersökningen medför ingen smärta men den kan vara obehaglig. Efter undersökningen kan det förekomma irritation i slemhinnan.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

