

## Provokationstest med metakolin

Med hjälp av undersökningen utreds luftrörens benägenhet för sammandragningar.

Undersökningen tar cirka 60 minuter.

### Före undersökningen

Var innan undersökningen:

- **4 timmar** utan kaffe, te, coladrycker och energidrycker
- **4 timmar** utan att äta en kraftig måltid
- **2 timmar** utan att röka
- **1,5 dygn** utan alkohol

Du kan äta en lätt måltid.

Undvik kraftig fysisk ansträngning cirka 2 timmar innan undersökningen.

### Läkemedelsbehandling

- Du kan ta dina läkemedel som vanligt
- Läkemedelsuppehåll enligt bilagan
- Läkemedel enligt din egen läkares instruktioner

**Ta som vanligt alla andra läkemedel utom de som har ordinerats för sjukdomar i andningsvägarna.**

Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

### Undersökning

Under undersökningen en skötare har dig att utföra inblåsningar i ett munstycke. Därefter får du andas in metakolinspray. Reaktionen på metakolin följs med inblåsningar. Till sist ges luftrörsvidgande läkemedel och blåsprovet kontrolleras för att bekräfta att ditt tillstånd har återgått till det normala. Blåsningarna kan kännas lindrigt ansträngande.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Om du inte kan komma den bokade tiden, om du får en luftvägsinfektion (t.ex. förkyld, snuva) innan undersökningen eller någon annan plötslig sjukdom ska du meddela det så fort som möjligt till ditt undersökningsställe.

Undersökningen kan genomföras först cirka **fyra veckor efter tillfriskning från luftvägsinfektionen** och först **två veckor efter influensavaccination**.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen. Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

## Läkemedel som påverkar lungfunktionstesterna

När lungfunktionen undersöks utan läkemedelspåverkan ska du vara utan dessa läkemedel under åtminstone den nedan nämnda tiden.

Accolate <b>3 dygn</b> Adrenalin, Epipen <b>12 t</b> Aerobec <b>4 veckor</b> Airomir <b>12 t</b> Alvesco <b>4 veckor</b> Aminocont <b>3 dygn</b> Anoro <b>3 dygn</b> Asmanex <b>4 veckor</b> Astecon <b>3 dygn</b> Atrodual <b>24 t</b> Atrovent <b>24 t</b> Atrovent comp <b>24 t</b>	Efedrin <b>12 t</b> Efedriini <b>12 t</b> Efedriini hydrokloridi <b>12 t</b> Eklira <b>2 dygn</b> Entocort <b>4 veckor</b> Euphylong <b>3 dygn</b>	Lomudal <b>12 t</b> Medrol <b>4 veckor</b> * Montelukast <b>3 dygn</b>	Spiriva <b>4 dygn</b> Striverdi <b>7 dygn</b> <input type="checkbox"/> Symbicort <b>2 dygn</b> <input type="checkbox"/> Symbicort <b>4 veckor</b>
Beclomet <b>4 veckor</b> Bricanyl <b>12 t</b> Budenofalk <b>4 veckor</b> Budesonid(e) <b>4 veckor</b> <input type="checkbox"/> Bufomix <b>2 dygn</b> <input type="checkbox"/> Bufomix <b>4 veckor</b> Buventol <b>12 t</b>	Flixotide <b>4 veckor</b> Flutide <b>4 veckor</b> <input type="checkbox"/> Flutiform <b>2 dygn</b> <input type="checkbox"/> Flutiform <b>4 veckor</b> Fomeda <b>2 dygn</b> Foradil <b>2 dygn</b> Formaxa <b>2 dygn</b> Formoterol <b>2 dygn</b>	Novopulmon <b>4 veckor</b> Onbrez <b>7 dygn</b> Oxis <b>2 dygn</b>	Theofol <b>3 dygn</b> Theofol comp <b>3 dygn</b> Theofyllini <b>3 dygn</b> Tilade <b>24 t</b> <input type="checkbox"/> Trelegy <b>3 dygn</b> <input type="checkbox"/> Trelegy <b>4 veckor</b> <input type="checkbox"/> Trimbow <b>12 dygn</b> <input type="checkbox"/> Trimbow <b>4 veckor</b>
Cykloterol <b>2 dygn</b>	Fomeda <b>2 dygn</b> Foradil <b>2 dygn</b> Formaxa <b>2 dygn</b> Formoterol <b>2 dygn</b>	Onbrez <b>7 dygn</b> Oxis <b>2 dygn</b>	Tilade <b>24 t</b> <input type="checkbox"/> Trelegy <b>3 dygn</b> <input type="checkbox"/> Trelegy <b>4 veckor</b> <input type="checkbox"/> Trimbow <b>12 dygn</b> <input type="checkbox"/> Trimbow <b>4 veckor</b>
Daxas <b>5 dygn</b> Dexametason <b>4 veckor</b> Duaklir <b>2 dygn</b>	Hydrocortison <b>4 veckor</b> * Incruse <b>3 dygn</b> <input type="checkbox"/> Innovair <b>2 dygn</b> <input type="checkbox"/> Innovair <b>4 veckor</b> Ipraxa <b>24 t</b> IpramoL <b>24 t</b> Inspiolto <b>7 dygn</b>	Racinephrine <b>12 t</b> <input type="checkbox"/> Relvar <b>3 dygn</b> <input type="checkbox"/> Relvar <b>4 veckor</b> Retafyllin <b>3 dygn</b> Rinexin <b>12 t</b>	Ultibro <b>12 dygn</b> Ventilastin <b>12 t</b> Ventoline <b>12 t</b>
	Incruse <b>3 dygn</b> <input type="checkbox"/> Innovair <b>2 dygn</b> <input type="checkbox"/> Innovair <b>4 veckor</b> Ipraxa <b>24 t</b> IpramoL <b>24 t</b> Inspiolto <b>7 dygn</b>	Salbutamol <b>12 t</b> <input type="checkbox"/> Salflumix <b>4 veckor</b> <input type="checkbox"/> Salflumix <b>48 t</b> <input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason <b>4 veckor</b> <input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason <b>48 t</b> Seebri <b>12 dygn</b> <input type="checkbox"/> Seretide <b>2 dygn</b> <input type="checkbox"/> Seretide <b>4 veckor</b> Serevent <b>2 dygn</b> Singulair <b>3 dygn</b> Solomet <b>4 veckor</b> *	Hostmediciner <b>3 dygn</b>  * uppehåll, om de ingår i behandlingen av astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)