

Toleranstest i stående, Tilt

Med hjälp av undersökningen utreds yrselsymtom i liggande och i stående.

Undersökningen tar cirka 2 timmar.

Förberedelse för undersökningen

Var innan undersökningen:

- **4 timmar** utan att äta
- **4 timmar** utan kaffe, te, coladrycker och energidrycker
- **1 dygn** utan alkohol
- **utan att röka** på undersökningdagen

Du får dricka lite vatten.

Vila ut ordentligt natten före undersökningen.

Undvik kraftig fysisk ansträngning cirka 2 timmar innan undersökningen.

Om du har insulinbehandlad diabetes och din behandlande läkare har gett dig en annan anvisning angående förberedelserna ska du följa den.

Du kan ta dina läkemedel som vanligt. Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Undersökning

Undersökningen inleds med cirka 10 minuters vila i undersökningsbädden. Undersökningsbädden lutas under läkarövervakning i upprätt ställning och lutningen pågår under cirka 40 minuter.

Under undersökningen följs bl.a. EKG och blodtryck.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

