

Spirometri

Med hjälp av undersökningen utreds lungfunktionen.

Undersökningen tar cirka 30 - 45 minuter.

Förberedelse för undersökningen

Var innan undersökningen:

- **4 timmar** utan kaffe, te, coladrycker och energidrycker
- **4 timmar** utan att äta en kraftig måltid
- **2 timmar** utan att röka
- **1 dygn** utan alkohol

Du kan äta en lätt måltid.

Undvik kraftig fysisk ansträngning cirka 2 timmar innan undersökningen.

Läkemedelsbehandling

- Du kan ta dina läkemedel som vanligt
- Läkemedelsuppehåll enligt bilagan
- Läkemedel enligt din egen läkares instruktioner

Ta som vanligt alla andra läkemedel utom de som har ordinerats för sjukdomar i andningsvägarna.

Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Undersökning

Under undersökningen får du andas lugnt och/eller blåsa kraftigt i ett munstycke. Blåsningarna kan kännas lindrigt ansträngande.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Om du inte kan komma den bokade tiden, om du får en luftvägsinfektion (t.ex. förkyld, snuva) innan undersökningen eller någon annan plötslig sjukdom ska du meddela det så fort som möjligt till ditt undersökningsställe. Undersökningen kan genomföras först cirka två veckor efter tillfriskning från luftvägsinfektionen.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

Läkemedel som påverkar lungfunktionstesterna

När lungfunktionen undersöks utan läkemedelspåverkan ska du vara utan dessa läkemedel under åtminstone den nedan nämnda tiden.

Accolate 3 dygn	Efedrin 12 t	Lomudal 12 t	Spiriva 4 dygn
Adrenalin, Epipen 12 t	Efedriini 12 t	Medrol 4 veckor *	Striverdi 7 dygn
Aerobec 4 veckor	Efedriini hydrokloridi 12 t	Montelukast 3 dygn	<input type="checkbox"/> Symbicort 2 dygn
Airomir 12 t	Eklira 2 dygn	Novopulmon 4 veckor	<input type="checkbox"/> Symbicort 4 veckor
Alvesco 4 veckor	Entocort 4 veckor	Onbrez 7 dygn	Theofol 3 dygn
Aminocont 3 dygn	Euphylong 3 dygn	Oxis 2 dygn	Theofol comp 3 dygn
Anoro 3 dygn	Flixotide 4 veckor	Prednisolon 4 veckor *	Theofylliini 3 dygn
Asmanex 4 veckor	Flutide 4 veckor	Prednison 4 veckor *	Tilade 24 t
Astecon 3 dygn	<input type="checkbox"/> Flutiform 2 dygn	Pulmicort 4 veckor	<input type="checkbox"/> Trelegy 3 dygn
Atrodual 24 t	<input type="checkbox"/> Flutiform 4 veckor	Racinephrine 12 t	<input type="checkbox"/> Trelegy 4 veckor
Atrovent 24 t	Fomeda 2 dygn	<input type="checkbox"/> Relvar 3 dygn	<input type="checkbox"/> Trimbow 12 dygn
Atrovent comp 24 t	Foradil 2 dygn	<input type="checkbox"/> Relvar 4 veckor	<input type="checkbox"/> Trimbow 4 veckor
Beclomet 4 veckor	Formaxa 2 dygn	Retafyllin 3 dygn	Ultibro 12 dygn
Bricanyl 12 t	Formoterol 2 dygn	Rinexin 12 t	Ventilastin 12 t
Budenofalk 4 veckor	Hydrocortison 4 veckor *	Salbutamol 12 t	Ventoline 12 t
Budesonid(e) 4 veckor	Incruse 3 dygn	<input type="checkbox"/> Salflumix 4 veckor	Hostmediciner 3 dygn
<input type="checkbox"/> Bufomix 2 dygn	<input type="checkbox"/> Innovair 2 dygn	<input type="checkbox"/> Salflumix 48 t	* uppehåll, om de ingår i
<input type="checkbox"/> Bufomix 4 veckor	<input type="checkbox"/> Innovair 4 veckor	<input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason 4 veckor	behandlingen av astma
Buventol 12 t	Ipraxa 24 t	<input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason 48 t	eller kroniskt obstruktiv
Cykloterol 2 dygn	Ipramol 24 t	Seebri 12 dygn	lungsjukdom (COPD)
Daxas 5 dygn	Inspiolto 7 dygn	<input type="checkbox"/> Seretide 2 dygn	
Dexametason 4 veckor		<input type="checkbox"/> Seretide 4 veckor	
Duaklir 2 dygn		Serevent 2 dygn	
		Singulair 3 dygn	
		Solomet 4 veckor *	