

Kväveoxidundersökning

Du har fått en remiss till en kväveoxidundersökning.

Vid en kväveoxidmätning mäts mängden av kväveoxid i utandningsluften. Det finns alltid en liten mängd kväveoxid i utandningsluften, men mängden ökar klart i samband med alla infektionssjukdomar till exempel astma.

Undersökningen tar cirka 20 minuter.

Förberedelse för undersökningen

Före undersökningen ska du vara:

- 4 timmar utan kaffe, te, energidrycker och drycker som innehåller cola, stora måltider, dock inte fastande
- 2 timmar utan att röka
- 1,5 dygn utan alkohol

En lätt måltid kan ätas.

Medicinering

- All medicinering som tidigare
- Uppehåll i medicinering enligt läkemedelsförteckningen på följande sida
- Enligt din egen läkares instruktioner

Ta läkemedel som föreskrivs för andra sjukdomar än respiratoriska sjukdomar alltid normala.

Ta recept eller information av dina mediciner med dig när du kommer till undersökningen.

Undvika stor fysisk ansträngning ca två timmar före undersökningen.

Undersökning

Du blåser eller andas 2 långa utandningar genom ett munstycke. Sköterska ger dig instruktioner.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Undersökningens resultat får du av den behandlade läkaren. Om du inte har fått en mottagningstid eller telefontid, kontakta den vårdande enheten.

Om du inte kan komma till undersökningen, om du insjuknar i luftvägsinfektion före undersökningen (till exempel feber, förkylning, ont i halsen) eller någon annan akut sjukdom ber vi dig omedelbart ta kontakt med den nedan angivna undersökningsenheten för att boka en ny tid. Undersökning kan göras förrän ungefär två veckor efter den förbättrade luftvägsinflammation.

Om inte den reserverade undersökningen annulleras uppbärs en separat straffavgift.

Mediciner som påverkar lungfunktionundersökningar

När man skall undersöka lungfunktion utan påverkan av läkemedel, skall du låta bli att ta dessa mediciner på följande sätt.

Accolate 3 dygn	Efedrin 12 t	Lomudal 12 t	Spiriva 4 dygn
Adrenalin, Epipen 12 t	Efedriini 12 t		Striverdi 7 dygn
Aerobec 4 veckor	Efedriini hydrokloridi 12 t	Medrol 4 veckor *	<input type="checkbox"/> Symbicort 2 dygn
Airomir 12 t		Montelukast 3 dygn	<input type="checkbox"/> Symbicort 4 veckor
Alvesco 4 veckor	Eklira 2 dygn		
Aminocont 3 dygn	Entocort 4 veckor	Novopulmon 4 veckor	Theofol 3 dygn
Anoro 3 dygn	Euphylong 3 dygn		Theofol comp 3 dygn
Asmanex 4 veckor		Onbrez 7 dygn	Theofylliini 3 dygn
Astecon 3 dygn	Flixotide 4 veckor	Oxis 2 dygn	Tilade 24 t
Atrodual 24 t	Flutide 4 veckor		<input type="checkbox"/> Trelegy 3 dygn
Atrovent 24 t	<input type="checkbox"/> Flutiform 2 dygn	Prednisolon 4 veckor *	<input type="checkbox"/> Trelegy 4 veckor
Atrovent comp 24 t	<input type="checkbox"/> Flutiform 4 veckor	Prednison 4 veckor *	<input type="checkbox"/> Trimbaw 12 dygn
	Fomeda 2 dygn	Pulmicort 4 veckor	<input type="checkbox"/> Trimbaw 4 veckor
Beclomet 4 veckor	Foradil 2 dygn		
Bricanyl 12 t	Formaxa 2 dygn	Racinephrine 12 t	Ultibro 12 dygn
Budenofalk 4 veckor	Formoterol 2 dygn	<input type="checkbox"/> Relvar 3 dygn	
Budesonid(e) 4 veckor		<input type="checkbox"/> Relvar 4 veckor	Ventilastin 12 t
<input type="checkbox"/> Bufomix 2 dygn	Hydrocortison 4 veckor *	Retafyllin 3 dygn	Ventoline 12 t
<input type="checkbox"/> Bufomix 4 veckor		Rinexin 12 t	
Buventol 12 t	Incruse 3 dygn		Hostmediciner 3 dygn
	<input type="checkbox"/> Innovair 2 dygn	Salbutamol 12 t	
Cykloterol 2 dygn	<input type="checkbox"/> Innovair 4 veckor	<input type="checkbox"/> Salflumix 4 veckor	* uppehåll om produkten används för astma eller COPD
	Ipraxa 24 t	<input type="checkbox"/> Salflumix 48 t	
Daxas 5 dygn	IpramoL 24 t	<input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason 4 veckor	
Dexametason 4 veckor	Inspiolto 7 dygn	<input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason 48 t	
Duaklir 2 dygn		Seebri 12 dygn	
		<input type="checkbox"/> Seretide 2 dygn	
		<input type="checkbox"/> Seretide 4 veckor	
		Serevent 2 dygn	
		Singulair 3 dygn	
		Solomet 4 veckor *	