

## Botulinuminjektion under EMG-kontroll och förberedelser inför den

Botulinuminjektioner används till exempel vid behandling av rörelserubbningar (bland annat dystoni och spasticitet) med konstant eller tidvis förhöjd muskelspänning.

Åtgärden tar cirka 15 – 30 minuter.

### **Före behandlingsåtgärd**

Du får äta och dricka normalt. Ta på dig kläder som lätt går att ta av.

### **Under behandlingsåtgärd**

Med hjälp av en tunn nål registreras den elektriska aktiviteten i muskeln och läkemedelssubstansen injiceras i målmuskeln. Intramuskulär injektion av botulinumtoxin försvagar styrkan i den respektive muskeln. Ibland kan botulinumtoxinet temporärt försvaga muskeln mer än planerat. Till exempel. botulinbehandling i området vid munnen eller nacken kan ibland förorsaka en temporär svårighet att svälja, och till exempel botulinbehandling i ansiktet, i området kring ögonen kan försvåra förmågan att blunda.

Åtgärden har vanligtvis inga efterverkningar. Eventuella övergående biverkningar kan vara hematom, infektion, lokal smärta eller en liten vävnadsskada på injektionsstället. För en del personer, som lider av kronisk smärta, kan den vanliga smärtan tillfälligt öka till en dag efter denna undersökning, men det är sällsynt.

Läkemedlets effekt visar sig 3 -14 dagar efter injektionen.

### **Efter behandlingsåtgärd**

Om du inte vet hur behandlingen fortsätts, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till behandlingsåtgärden.

### **Annat att beakta**

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.

Avboka tiden om du inte kan komma.

Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.

