

Jitter-undersökning och förberedelser inför undersökningen

Jitter är en EMG-specialundersökning (undersökning av musklernas elektriska aktivitet), där man med hjälp av en tunn nålelektrod mäter den elektriska aktiviteten i en enskild muskelfiber.

Undersökningen tar ca 1 – 1 1/2 timme.

Före undersökning

Om du har Mestinon-medicinering, skall du kontakta den läkare som vårdar dig för att få reda på om du måste hålla en paus i medicineringen före undersökningen.

Du får äta och dricka normalt.

Under undersökning

Du ligger på en bräda medan undersökningen pågår. Läkaren mäter med en tunn nålelektrod den elektriska aktiviteten i en enskild muskelfiber.

Undersökningen har vanligtvis inte några efterverkningar, men övergående blodutgjutning vid injektionsstället, lokal smärta, liten vävnadsskada eller mycket sällan inflammation är möjlig. För en del personer, som lider av kronisk smärta, kan den vanliga smärtan tillfälligt öka till en dag efter denna undersökning, men det är sällsynt.

Efter undersökning

Du får undersökningsresultaten av läkaren som vårdar dig.

Om du inte vet hur du får resultaten, fråga polikliniken eller avdelningen som skickade dig till undersökningen.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka tiden om du inte kan komma.

Om du inte avbokar tiden kommer du att debiteras en straffavgift.

