

Botuliini-injektio EMG-ohjauksessa ja siihen valmistautuminen

Botuliini-injektiota käytetään esimerkiksi hoidettaessa liikehäiriöitä (muun muassa dystonia ja spastisiteetti), joissa esiintyy liiallista lihasjänteiden jatkuvaa tai ajoittaista kasvua.

Toimenpide kestää 15 – 30 minuuttia.

Ennen hoitotoimenpidettä

Saat syödä ja juoda normaalisti. Pukeudu niin, että hoidettava alue on helppo riisua paljaaksi.

Hoitotoimenpiteen aikana

Ohuen neulan avulla rekisteröidään lihaksen sähköistä toimintaa ja ruiskutetaan lääkeaine kohdelihakseen. Kohdelihakseen pistetty botuliini heikentää ko. lihaksen voimaa. Joskus botuliini saattaa heikentää tilapäisesti lihasta suunniteltua enemmän. Esimerkiksi suun tai kaulan alueelle annettu botuliinihoito voi joskus aiheuttaa ohimenevää nielemisvaikeutta, ja esimerkiksi kasvoille silmien ympäristöön annettu botuliini voi vaikeuttaa silmän sulkemista.

Toimenpiteellä ei yleensä ole haittavaikutuksia. Mahdollisia ohimeneviä haittavaikutuksia on pistokohdan verenpurkauma, infektio, paikallinen kipu tai pieni kudosaivaurio. Joillakin kroonisesta kivusta kärsivillä heidän tavanomainen kipuoireensa saattaa tilapäisesti korostua tämän tutkimuksen jälkeen noin yhden päivän ajan, mutta tämä on harvinaista.

Lääkkeen vaikutus ilmaantuu 3-14 päivää lääkkeen annon jälkeen.

Hoitotoimenpiteen jälkeen

Jos et tiedä, kuinka hoitoa jatketaan, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin hoitotoimenpiteeseen.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.
Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

